

Terugbetaling?



Uw mutualiteit betaalt 75% van de kostprijs voor logopedie terug wanneer u voldoet aan de voorwaarden (voldoende taalachterstand en een normaal IQ en gehoor). Dit geldt voor 384 sessies gedurende maximum twee jaar.

Wanneer het kind na een periode van logopedische therapie een hardnekkige achterstand blijft vertonen in minstens drie domeinen, dan kan de diagnose dysfasie gesteld worden door een kinder-neuroloog. Terugbetaling is dan mogelijk tot de leeftijd van 17 jaar.

Contacteer uw logopedist of mutualiteit voor meer informatie.



Ontwikkelingsdysfasie

Heeft mijn kind een taalstoornis?



Het verschil tussen een vertraagde taalontwikkeling en een taalontwikkelingsstoornis.

Wanneer is de taal een probleem?

Verschillende taalcomponenten

Onze taal is een complex gebeuren dat we grofweg in drie grote componenten kunnen verdelen. De taalvorm heeft betrekking op het leren van klanken, het verbuigen van woorden (bijvoorbeeld “kast - kastje”) en het formuleren van correcte zinnen. De taalinhoud omvat de woordenschat en de betekenis van woorden en zinnen. Het taalgebruik heeft betrekking op de communicatie (hoe zeg je iets en waarom zeg je het?).

Normale taalontwikkeling

Kinderen leren een taal door de wereld rondom hen te verkennen. Taal is overal. Ze zien, voelen en horen iedere dag nieuwe dingen. En daarover wordt gepraat, ook door volwassenen. U herkent vast wel dergelijke uitingen naar kinderen toe:



Kijk eens wat een grote hond! Hoe doet de hond? Woef woef! Die kan hard blaffen, hé...

Secundaire taalontwikkelingsproblemen

De taalontwikkeling van een kind hangt samen met allerlei andere factoren. Wanneer andere moeilijkheden in de ontwikkeling van het kind de taalontwikkelingsproblemen kunnen verklaren, dan spreken we over secundaire taalontwikkelingsproblemen. Denk bijvoorbeeld aan problemen met het zicht of gehoor, een motorische handicap, een lage intelligentie, autisme, enzovoort. Ook wanneer het taalaanbod van de omgeving te beperkt of onaangepast is, is het mogelijk dat een kind minder vlot taal oppikt.

Vertraagde taalontwikkeling

Soms komt de taalontwikkeling later op gang, zonder dat daar duidelijke andere factoren de oorzaak van zijn. Het taalniveau van het kind komt dan eigenlijk overeen met dat van een jonger kind. Deze achterstand in de taalontwikkeling kan meestal verkleind of volledig verholpen worden met logopedische therapie.

Taalontwikkelingsstoornis

Wanneer de taalontwikkeling niet alleen vertraagd, maar ook afwijkend is, ondanks een normale ontwikkeling op andere domeinen, dan kan er sprake zijn van een taalontwikkelingsstoornis. Dit kan aangeboren zijn, maar ook een hersenletsel kan een terugval in de taalontwikkeling veroorzaken. De problemen blijven vaak hardnekkig aanwezig, ondanks logopedische therapie.

Diagnose dysfasie

Wanneer er onvoldoende vooruitgang is na minstens een jaar intensieve logopedische therapie, dan kan de diagnose ontwikkelingsdysfasie gesteld worden. Dit komt voor bij ongeveer 3% van de kinderen. Kinderen met dysfasie vertonen een gestoord taalprofiel, d.w.z. problemen met één of meerdere taalcomponenten (taalvorm, -inhoud en/of -gebruik). Verder zien we ook een vertraagde informatieverwerking en een zwak taalbegrip, problemen om zich uit te drukken, een beperkt vermogen om te communiceren, moeilijkheden met taaldenken en een gebrek aan innerlijke taal.